JOURNEES
TECHNIQUES
ACOUSTIQUE
ET VIBRATIONS

Etude paramétrique numérique de la propagation du son en forêt

Alexis Chopard, David Ecotière, Guillaume Dutilleux, Pierre Chobeau, Judicaël Picaut
Cerema Est – Laboratoire de Strasbourg

Introduction

- Propagation en forêt

- Zones calmes potentielles (directive 2002/49/EC)
- Protection contre le bruit (?)
- Bruit et biodiversité

Introduction

- Spécificités de la propagation en forêt

- **Effets de sol** [Huisman,1990],[Attenborough, 2012]

- sol multicouche complexe
- sol poreux

- **Diffusion et réflexions multiples**

- troncs [Price,1988] [Heimann, 2003] [Swearingen, 2007]
- branches et feuilles [Martens,1980] [Yang, 2013]

- **Effets météorologiques**

- gradients de température et de vent [Tunick,2003]

[Heimann, 2003]

Introduction

- Codes de calcul

- **Fréquentiels**

- GFPE [Barriere, 1999]
- periodic BEM / GFPE [Jean, 2011, 2015]

- **Temporels**

- FDTD [Price, 1988][Heimann, 2003][Swearingen, 2007]
- TLM [Chobeau, 2014, 2015]

Etude paramétrique : méthodologie

Méthodologie

● Configuration

(a) Top view

(b) Side view

$$\Delta L_{eq}(i) = \bar{L}_{eq}(i) - \bar{L}_{eq}(ref)$$

Méthodologie

● Calculs

- Méthode TLM 3D [Guillaume, 2013, 2014]
 - Discrétisation : spatiale $\lambda/8$ m, temporelle : $6,8 \cdot 10^{-5}$ s
 - Durée simulée : 0,5s
- Sol : coefficient de réflexion unique (0,3 [Chobbeau, 2014])
- Troncs d'arbres parfaitement réfléchissants [Reethof, 1976]
- Pas d'effets météorologiques
- Source : impulsion gaussienne (100Hz-1kHz)
- Paramètres étudiés :
 - Diamètre des troncs [0,2m ; 0,5m]
 - Distribution spatiale des troncs : régulière, aléatoire, agrégée
 - Profondeur de la forêt : max 30m

→ Quelle précision doit-on avoir sur la modélisation de la structure de la forêt ?

Résultats

Influence du diamètre des troncs

- Influence de la distribution des diamètres

Classe	D1	D2	D3	D4
Diamètre	15-24 cm	25-34 cm	35-44 cm	45-54 cm

Distribution uniforme dans chaque classe de diamètre

$d=0,2$ arbre/m²
L=20m

En sortie de forêt

Dans la forêt

Influence du diamètre des troncs

- Influence des diamètres médians

Classe	D1	D2	D3	D4
Diamètre	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm

$d=0,2$ arbre/m²
L=20m

Diamètre constant dans chaque classe de diamètre

En sortie de forêt

Dans la forêt

Résultats

- Influence de la distribution spatiale des troncs

- Aléatoire : processus de Poisson

$$P(N(S) = n) = \frac{S^n d}{n!} e^{-Sd}$$

- Agrégé : processus de Gibbs [Goreaud 2000]

Fonction coût sur les distances inter-points

Résultats

- Influence de la distribution spatiale des troncs

L=15m
d=0.2 a/m²

diam=0.3m
d=0.2 a/m²

En sortie de forêt

Résultats

- Influence de la distribution spatiale des troncs

L=15m
d=0.2 a/m²

diam=0.3m
d=0.2 a/m²

Résultats

- Influence de la profondeur de la forêt

$d=0,2$ arbre/m²
diam=0,3m

Perte par insertion
significative : $L > 15-20$ m

Conclusions

- Etude paramétrique préparatoire
- La dispersion des diamètres des troncs dans une classe de diamètre n'a pas d'influence significative sur la propagation acoustique

- Une distribution agrégée a la même influence qu'une distribution totalement aléatoire.

→ La modélisation de la forêt ne nécessite pas une connaissance fine de sa structure spatiale

- La perte par insertion de la forêt n'est significative qu'à partir de 15-20m d'épaisseur

Perspectives

- Etude paramétrique plus complète
 - Influence densité / diamètres / profondeur de forêt
 - Hauteur de récepteur
- Prise en compte d'effets supplémentaires :
 - effets météorologiques
 - effets de sol à l'aide d'une impédance de sol

CONGRÈS FRANÇAIS D'ACOUSTIQUE
joint avec le colloque **VIBRATIONS, SHOCKS, AND NOISE**
LE MANS, 11-15 AVRIL 2016

Merci !

Guillaume Dutilleux
+33 (0)3 88 77 46 07
Guillaume.dutilleux@cerema.fr